

Medicamento que **previene la transmisión del VIH post exposición.**

¡Ya disponible en el IMSS!

Es una estrategia que consiste en la toma diaria y por un mes de medicamento antirretroviral, dentro de las primeras 72 horas posteriores a haber tenido contacto de riesgo para prevenir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).




Acude a servicio de Urgencias si:

- Tuviste contacto con sangre, semen o fluidos vaginales con VIH o desconocimiento del estado de salud de la persona por relación sexual sin uso de condón o ruptura del mismo.
- Casos de violencia sexual con penetración.

Proceso

1 Consulta de valoración.




2 Te prescribirán tratamiento por un mes.



3 Deberás apegarte a la toma diaria.



4 Al finalizar el mes, te realizar nueva prueba de VIH.



●●○ Toma en cuenta:

- Es segura y con pocos efectos adversos.
- No está indicada cuando el periodo de la exposición es mayor a 72 horas, si has sobrepasado el tiempo, acude a consulta para detectar oportunamente alguna ITS.
- Es considerado una urgencia médica.



¿Tienes dudas?

El IMSS cuenta con diversos canales de información y comunicación como el Chatbot de atención VIHRTUAL IMSS (WhatsApp): 55 5497 8251 y el correo electrónico: enlace.prep@imss.gob.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL