

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PROGRAMA IMSS BIENESTAR
INDICADORES PASH
ENERO - DICIEMBRE 2020

| No. | Indicador | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Bueno | Regular | Crítico | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|-----|--|------------------|------------------------|--------|---------------|---------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1 | Tasa de Mortalidad Infantil | Tasa | Anual | ≤ 8.13 | 8.14 a 9.34 | ≥9.35 | | | | | | 9.81 | | | | | | |
| 2 | Razón de mortalidad materna | Razón | Anual | ≤ 9.92 | 9.93 a 13.51 | ≥13.52 | | | | | | 21.30 | | | | | | |
| 3 | Tasa de mortalidad neonatal | Tasa | Anual | ≤ 6.4 | 6.5 a 7.36 | ≥7.37 | | | | | | 6.48 | | | | | | |
| 4 | Tasa de hospitalización por diabetes no controlada. | Tasa | Anual | ≤ 4.98 | 4.99 a 5.73 | ≥5.74 | | | | | | 4.30 | | | | | | |
| 5 | Porcentaje de población atendida respecto a la población objetivo | Porcentaje | Anual | ≥84.00 | 71.40 a 83.99 | ≤71.39 | | | | | | 66.66 | | | | | | |
| 6 | Prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares | Porcentaje | Anual | ≤2.34 | 2.35 a 2.49 | ≥2.50 | | | | | | 2.96 | | | | | | |
| 7 | Porcentaje de menores de 1 año que cuentan con esquema completo de vacunación | Porcentaje | Semestral | ≥95.00 | 80.75 a 94.99 | ≤80.74 | | | | 67.59 | | | | | | 76.46 | | |
| 8 | Porcentaje de casos de diarrea aguda que son monitoreados para la búsqueda de Vibrio Cholerae | Porcentaje | Trimestral | ≥2.00 | 1.70 a 1.99 | ≤1.69 | | 1.63 | | | 1.44 | | | 1.53 | | | 1.54 | |
| 9 | Porcentaje de personas con diagnóstico reciente de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento | Porcentaje | Trimestral | ≥85.00 | 72.25 a 84.99 | ≤72.24 | | 99.87 | | | 95.30 | | | 91.90 | | | | 94.12 |
| 10 | Porcentaje de personas con diagnóstico reciente de diabetes mellitus que ingresan a tratamiento | Porcentaje | Trimestral | ≥85.00 | 72.25 a 84.99 | ≤72.24 | | 92.21 | | | 89.95 | | | 90.66 | | | | 92.15 |
| 11 | Porcentaje de pacientes mayores de 20 años con diabetes mellitus tipo 2 en control con hemoglobina glucosilada | Porcentaje | Anual | ≥67.00 | 31.99 a 66.99 | ≤31.98 | | | | | | 103.55 | | | | | | |
| 12 | Porcentaje de surtimiento completo de recetas médicas. | Porcentaje | Anual | ≥86.00 | 73.10 a 85.99 | ≤73.09 | | | | | | 76.12 | | | | | | |
| 13 | Porcentaje de familias que aplican las acciones de saneamiento básico respecto al total de familias ^{1/} | Porcentaje | Anual | ≥87.14 | 74.07 a 87.13 | ≤74.06 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Porcentaje de atención a quejas de los beneficiarios del Programa IMSS-BIENESTAR | Porcentaje | Semestral | ≥76.00 | 64.60 a 75.99 | 64.59 | | | | 63.10 | | | | | | 77.89 | | |
| 15 | Porcentaje de detecciones de violencia familiar y de género aplicadas a mujeres de 15 años y más respecto al total de detecciones. | Porcentaje | Trimestral | ≥73.00 | 62.05 a 72.99 | ≤62.04 | | 75.04 | | | 68.53 | | | 70.60 | | | | 73.82 |
| 16 | Porcentaje de detección de hipertensión arterial | Porcentaje | Trimestral | ≥99.50 | 84.58 a 99.49 | ≤84.57 | | 103.41 | | | 86.47 | | | 83.79 | | | | 86.29 |
| 17 | Porcentaje de seguimiento a personas con presión arterial de detección anormal | Porcentaje | Trimestral | ≥60.00 | 51.00 a 59.99 | ≤50.99 | | 62.07 | | | 60.88 | | | 61.28 | | | | 63.51 |
| 18 | Porcentaje de seguimiento a personas con glucemia de detección anormal | Porcentaje | Trimestral | ≥60.00 | 51.00 a 59.99 | ≤50.99 | | 72.26 | | | 71.88 | | | 73.30 | | | | 74.64 |
| 19 | Porcentaje de detección de diabetes mellitus | Porcentaje | Trimestral | ≥83.69 | 71.14 a 86.68 | ≤71.13 | | 86.84 | | | 73.43 | | | 71.75 | | | | 75.42 |
| 20 | Porcentaje de embarazadas atendidas en el primer trimestre gestacional | Porcentaje | Trimestral | ≥60.00 | 50.00 a 59.99 | ≤49.99 | | 57.79 | | | 56.74 | | | 56.74 | | | | 56.37 |
| 21 | Porcentaje de personas asesoradas y derivadas a la unidad médica por Voluntarios Rurales de Salud y Voluntarios con relación al número de personas identificadas | Porcentaje | Bimestral | ≥93.49 | 79.47 a 93.48 | ≤79.46 | | 91.66 | 91.91 | | 92.39 | | 93.24 | | 93.79 | | | 94.34 |
| 22 | Porcentaje de personas derivadas por parteras voluntarias rurales para atención y consulta. | Porcentaje | Bimestral | ≥97.90 | 83.22 a 97.89 | ≤83.21 | | 85.32 | 86.81 | | 87.83 | | 88.94 | | 89.46 | | | 89.89 |

Fuentes: Sistema de Información en Salud para la Población Adscrita (SISPA), Subsistema de Egresos, Urgencias y Lesiones (SEUL), Sistema Epidemiológico Estadístico de las Defunciones (SEED), Padrón de Población Adscrita del Programa IMSS-BIENESTAR, Anexo de población a vacunar por institución de los Lineamientos para la regionalización operativa del Programa de vacunación universal vigente, Reporte de metas de productividad del Programa IMSS-BIENESTAR, Sistema de vigilancia epidemiológica activa de la mortalidad materna, Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE), Encuesta anual de surtimiento completo de recetas médicas, Encuesta de aplicación de saneamiento básico.

1/ Información no disponible