

## ¿Qué es?

Las personas con infección por el virus sincitial respiratorio (o VSR) generalmente presentan síntomas dentro de los 4 a 6 días después de haberse infectado.

## Síntomas principales

- Esgurrimiento nasal
- Estornudos
- Tos
- Fiebre
- Apetito reducido
- Irritabilidad o menor actividad
- Silbido en el pecho
- Dificultad para respirar

El VSR también puede causar infecciones más graves, como bronquiolitis (inflamación de las vías respiratorias pequeñas del pulmón) y neumonía que pueden requerir hospitalización.

# ♦ VIRUS ♦ SINCITAL RESPIRATORIO



## Transmisión

El VSR es altamente contagioso, y se puede transmitir por:

- ★ El contacto estrecho entre las niñas y niños que asisten a las guarderías o escuelas.
- ★ Cuando una persona infectada tose o estornuda y las gotitas con virus entran a los ojos, nariz o boca.
- ★ Al tocar superficies en las que ha caído el virus al toser, estornudar o hablar (por ejemplo: manijas de las puertas, mesas, juguetes, utensilios de comida) y tocarse la cara sin lavarse las manos.

Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente son:

- ★ Bebés prematuros.
- ★ Niñas y niños menores de un año.
- ★ Niñas y niños pequeños con defectos cardíacos congénitos (desde el nacimiento) y enfermedad crónica de los pulmones.
- ★ Niñas y niños pequeños que tienen el sistema inmunitario deprimido (debilitado) debido a una enfermedad o un tratamiento médico.
- ★ Adultos con el sistema inmunitario deprimido.
- ★ Adultos mayores, especialmente aquellos con enfermedad cardíaca y pulmonar subyacente.

Fuente:  
National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases. Disponible en: <https://www.cdc.gov/rsv/index.html>

¿Quieres saber más?  
¡Escanéame!



FAMILIA IMSS | HISTORIAS DE IMSSPIRACIÓN

