

Rabia

transmitida por animales silvestres

El establecimiento de comunidades humanas en lugares cercanos a refugios naturales, como barrancas o cuevas, y la invasión del área donde habitan los animales silvestres, aumenta el riesgo de sufrir un ataque por animales infectados de rabia.

Los murciélagos hematófagos (que se alimentan de sangre) son los principales transmisores de rabia pues, al alimentarse, muerden al ganado, además de perros y gatos, que transmiten la rabia a las personas mediante el contacto directo con la saliva infectada, a través de lamidas, mordeduras o arañazos. Por esta razón es importante estar al pendiente de las heridas presentes en el ganado o en los animales domésticos.

La rabia en el ganado causa una importante pérdida en la economía del país.



Recomendaciones

La vacunación contra la rabia de gatos, perros u otros animales de compañía es el inicio de la prevención.

Evita el contacto con animales desconocidos o que presenten un comportamiento inusual.



La rabia se puede prevenir



Vacuna
a tus animales de compañía

¿Qué es la rabia?

Es una enfermedad que ataca al sistema nervioso central, el virus que lo causa infecta a mamíferos domésticos, silvestres y de uso comercial y puede transmitirse a las personas a través del contacto directo con saliva infectada por medio de lamidas, mordeduras o arañazos.

Los animales que la transmiten son:

Domésticos: Como el perro y el gato.



Silvestres: murciélago, lobo, zorro, zorrillo, mapache, tejón, gato montés, puma, lince, jaguar, ocelote, cacomixtle y mangosta.




Ganado: vacas, cerdos, caballos, mulas, borregos y cabras.



¿Cuáles son los síntomas

En etapa temprana son:

- dolor de cabeza
- fiebre
- quemazón o picazón en el lugar de la mordedura



Después aparecen síntomas neurológicos como:

- hiperactividad
- espasmos musculares involuntarios
- ansiedad
- alucinaciones
- convulsiones
- intolerancia a la toma de agua y a la luz
- hipersalivación



¿Qué hacer en caso de tener contacto con un animal sospechoso?



Ante el rasguño, mordedura o lamida de algún animal infectado por rabia se recomienda:

- Lavar de inmediato la herida con abundante agua y jabón.
- Secar con un paño limpio y dejar la herida al aire, sin tapar.
- Acudir inmediatamente a la unidad médica más cercana para recibir el tratamiento correspondiente.
- Observar al animal agresor por 10 días para identificar si tiene algún cambio de conducta.
- Una vez que aparecen los síntomas, la persona o el animal muere en unos cuantos días.
- Si el animal muere durante este periodo, no manipular el cadáver y notificarlo a las autoridades sanitarias.
- Si se trata de fauna silvestre, evitar capturarla y reportar el sitio donde ocurrió el contacto.