Día Mundial de la Prematuridad



La prematuridad es la principal causa de defunción en niñas y niños menores de cinco años

17 de noviembre



Factores de riesgo

Embarazos múltiples, infecciones, hipertensión, diabetes, tabaquismo, consumo de drogas y embarazo en la adolescencia.

Prevención

Para evitar complicaciones y muertes por parto prematuro, acude con el personal de salud antes y durante el embarazo para identificar factores de riesgo.

Clasificación por edad gestacional

- Prematuro extremo: menos de 28 semanas.
- Muy prematuro: de 28 a 31 semanas.
- Prematuro moderado: de 32 a 33 semanas.
- Prematuro tardío: de 34 a 36 semanas.



Clasificación por peso al nacer

- Bajo peso: menos de 2,500 gramos.
- Muy bajo peso: menos de 1,500 gramos.
- Extremo bajo peso: menos de 1,000 gramos.



Complicaciones

Quienes sobreviven a un nacimiento prematuro pueden presentar discapacidades de por vida, como problemas de:

- aprendizaje,
- visuales o
- auditivos.

La intervención oportuna previene complicaciones y muertes prematuras

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL